

Cita Fecha: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Hora: \_\_\_:\_\_\_

## PREPARACIÓN PARA SU PRUEBA DE ALERGIA INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Por favor revise la lista de medicamentos a continuación. Para mejores resultados, es importante suspender el uso de estos medicamentos para la fecha indicada.

### TENGA EN CUENTA:

Si usted tiene antecedentes de anafilaxia (una reacción alérgica que amenaza su vida) por favor, continúe el uso de sus medicamentos, incluso antes de la prueba de alergia. Si no está seguro de su historia, por favor consulte a su médico.

### Medecamentos que debe suspender antes de la Prueba alérgica de Piel Antihistamínicos / Los medicamentos que contienen antihistamínicos

- Actifed
- Acid Reflux Meds
- Allegra
- Aspirin
- Atarax
- Atrohist
- Benadryl
- Bromfed
- Chlorpheniramine
- Chlor-Trimeton
- Clarinex
- Claritin
- Codimal
- Comhist
- Deconamine
- Dimetapp
- Dramamine
- Excedrin PM
- Extendryl
- Ibuprofen
- Isochlor
- Kronofed
- Loratadine
- Marax
- Midol PM
- Naldecon
- Nolahist
- Nolamine
- Novahistine
- Nyquil
- Optimine
- Periactin
- Phenergan
- Polyhistine
- Proaramine
- Ritalin
- Rondec
- Ru-Tuss
- Rynatan
- Tavist-1
- Tavist-2
- Teldrin
- Tagamet
- Trinalin
- Tylenol PM
- Vistaril
- Zantec
- Zyrtec

### Por favor, consulte con su médico antes de suspender cualquier prescripción antidepresivos

#### Los antidepresivos tricíclicos

**NO Tomar** 3 días antes de su prueba de alergia

Adapin, Anafranil, Asendin, Elavil, Etrafon, Limbitrol, Norpramin, Pamelor, Sinequan, Surmontil, Tofranil, Triavil, Vivactil.

#### Los antidepresivos

**NO Tomar** 3 días antes de la prueba de alergia

Atarax, Ativan, BuSpar, Desyrel, Effexor, Nardil, Paxil, Prozac, Remeron, Serzone, Sinequan, Surmontil, Tofranil, Trancopal, Tranxene, Valium, Vistaril, Wellbutrin, Xanax, Zoloff.

Si usted está tomando actualmente un beta-bloqueador (listados abajo) prescrito por su médico no se le permitira tener la prueba de alergia en la piel preformada ; solo si : 1) el medicamento se puede interrumpir , o : 2) substituir 3 días antes de la prueba. Si no, un examen de sangre estándar y de rutina para las alergias pueden ser preformado en su lugar.

A continuación se muestra una lista de los betabloqueantes que pueden ayudar a identificar el o los medicamentos que está tomando actualmente. Estos medicamentos tienen diversas indicaciones para el uso, pero son especialmente utilizados para tratar una enfermedad relacionada con el corazón. Si está tomando medicamentos para el corazón y no está seguro de si se les clasifica como un beta-bloqueante, por favor consulte a su médico.

► **Bloqueadores beta - para hipertension (presión arterial alta)**

- |                              |                               |                           |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| • Betapace (Sotalol HCL)     | • Blocadren (Timolol Maleate) | • Brevibloc (Esmolol)     |
| • Cartrol (Cartelol HCL)     | • Corgard (Nadolol)           | • Corzide (Nadolol)       |
| • Inderal (PropranololHCL)   | • Inderide (Propranolol)      | • Kerlone (Betaxolol HCL) |
| • Labetalol                  | • Levatol (Penbutolol)        | • Lompressor (Metoprolol) |
| • Metoprolol                 | • Nadolol                     | • Normodyne (Labetalol)   |
| • Normozide (Labetalol)      | • Propranolol                 | • Sectral (Acebutolol)    |
| • Sotalol                    | • Tenormin (Atenolol)         | • Tenoretic (Atenolol)    |
| • Timolide (Timolol Maleate) | • Toprol-XL (Metoprolol)      | • Trandate (Labetalol)    |
| • Visken (Pindolol)          | • Zebeta (Bisoprolol)         | • Ziac (Bisoprolol)       |

► **Offálmica Bloqueadores beta - para Glaucoma**

- Betaxan (betaxolol) • Betoptic (betaxolol) • Betagan (Levobunolol) • Timoptic (Timolol) • Cosopt (timolol)

► **No Tome Durante 3 Días** antes de la prueba de alergia

- Medicamentos: Los antihistamínicos o medicamentos que contienen antihistamínicos (Ver lista) • Relajantes musculares o tranquilizantes • Antidepresivos (Consulte con su médico antes de suspender cualquier antidepresivos) • Sedantes • Aerosoles nasales El ibuprofeno (Advil, Motrin, etc) y los fármacos antiinflamatorios no esteroideos. Aspirina, Excedrin, o Alka-Seltzer • Las dosis grandes de la vitamina C.

**Notifique** al departamento de alergia si usted recibe **esteroides** en cualquier forma (por vía oral, mediante inyección, en los tendones, las articulaciones, por vía intravenosa o mediante una loción o crema 4 semanas anteriores a la prueba.

**Usted puede tomar los siguientes medicamentos hasta el momento de su prueba de alergia**

- Medicamentos para el asma (tratar de evitar durante 6 horas antes de la prueba de la alergia) • Tylenol • Control de la natalidad • medicamentos para la presión arterial (con excepción de los beta-bloqueadores se señaló anteriormente) • Hormonas Las píldoras de Fluidos • descongestionantes Plain (aquellos sin los antihistamínicos)